



Opløsning af ikke-permanente Fillers

Fortryder du din fillerbehandling?

Oplever du efter en fillerbehandling uønskede filler-kugler, ujævnheder eller andre kosmetiske gener, behøver du ikke gå rundt med det.

Hos DrQ har vi stor erfaring med vurdering og behandling af kosmetiske gener efter fillerbehandling. Vi foretager en individuel vurdering og rådgiver dig om de muligheder, der er bedst egnet til netop din situation.

Har du fortrudt din behandling, eller ønsker du en vurdering af dine filler-gener, er du velkommen til at kontakte DrQ.

Opløsning af ikke-permanente fillers

Ikke-permanente fillers kan i mange tilfælde korrigeres eller reduceres, afhængigt af hvilket materiale der er anvendt. Ved fillers baseret på hyaluronsyre kan man anvende enzymet hyaluronidase, som nedbryder hyaluronsyren og dermed kan reducere eller fjerne fillerens volumen.

Behandlingen kan være relevant ved eksempelvis overkorrektio, asymmetri, uønsket volumen, migration eller synlige knuder efter behandling med hyaluronsyrebaseret filler.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at ikke alle ikke-permanente fillers kan opløses med hyaluronidase. Fillers med andre materialer, eksempelvis polycaprolacton eller calciumhydroxyapatit, kan ikke opløses på samme måde. Derfor er det vigtigt at kende det anvendte produkt, før en eventuel opløsning vurderes.

Inden behandlingen foretages en individuel vurdering af området, fillerens type og patientens ønsker. I nogle tilfælde kan én behandling være tilstrækkelig, mens der i andre situationer kan være behov for yderligere vurdering og eventuel behandling.

Ved komplikationer

Ved komplikationer efter fillerbehandling, særligt hvis der opstår betydelige smerter, misfarvning af huden eller synsforstyrrelser, kræves hurtig medicinsk vurdering, da enkelte komplikationer er tidskritiske.

Book online → miobooking.com/drq

Alle priser fastsættes endeligt ved konsultation.